



➤ Portafolio de productos

Ganasal
con Phosbić

Ganaderos ganadores de verdad

Nos ocupamos de su ganado como si fuera el nuestro
porque somos ganaderos como usted.

PBX: (+57) 602 280 6888

Palmira: Ext.: 216 - **Malambo:** Ext.: 192 - **Cota:** Ext.: 142 - **Girón:** Ext.: 169

 @ganasal |  @ganasaltv |  @ganasal | www.ganasal.com

Ganasal

con Phosbić



Ver productos

Ganasal Enerprot

con Phosbić®




Ver productos

Ganasal Ganagras



Ver producto



GANASAL 8%

- **Regiones:** Trópico medio y bajo de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, Tolima, Cesar, Caribe Sur (Córdoba, Sucre), Caquetá, Guaviare, Magdalena, Meta, Vichada.

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASAL 8%	Cría	Vacas paridas	80 a 120
		Vacas horras vacías	80 a 120
		Vacas horras preñadas	60 a 80
		Novillas reemplazo	60 a 80
	Lechería	Vacas paridas	100 a 150
		Vacas horras vacías	100 a 150
		Vacas horras preñadas	80 a 120
		Novillas reemplazo	60 a 80
	Toros		150 a 250

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

> Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

> Presentaciones:

Saco de polipropileno laminado con liner de polietileno, en presentación de 40 kg y 50 kg.

GANASAL 8% PODAL

> Indicaciones de uso:

- Suministrar a las hembras bovinas según los requerimientos para las diferentes etapas productivas y peso vivo. Para óptimos resultados proporcione el producto con base en la oferta, la calidad nutricional del forraje y la época del año. El suministro debe ser preferiblemente diario o con frecuencia de máximo 2 días, a libre voluntad y en saladero cubierto.
- **Restricciones de uso del producto:** Preferiblemente no suministrar en zonas con suelos y forrajes con altos niveles de selenio.
- **Regiones:** Trópico alto, medio y bajo de Antioquia, Boyacá, Cauca, Caldas, Cundinamarca, Huila, Nariño, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, Tolima, Valle del Cauca; trópico bajo de Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena, Meta, Sucre, Vichada.

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASAL 8% PODAL	Cría	Vacas paridas	80 a 120
		Vacas horras vacías	80 a 120
		Vacas horras preñadas	60 a 80
		Novillas reemplazo	60 a 80
	Lechería	Vacas paridas	100 a 150
		Vacas horras vacías	100 a 150
		Vacas horras preñadas	80 a 120
		Novillas reemplazo	60 a 80
	Lechería Especializada	Vacas paridas	150 a 250
		Vacas secas	100 a 150
		Novillas reemplazo	80 a 100
	Toros		150 a 250

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

> Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena

GANASAL 8% CONTROL SELENIO Y MOLIBDENO

> Indicaciones de uso:

- Suministrar a las hembras bovinas según los requerimientos para las diferentes etapas productivas y peso vivo. Para óptimos resultados proporcione el producto con base en la oferta, la calidad nutricional del forraje y la época del año. El suministro debe ser preferiblemente diario o con frecuencia de máximo 2 días, a libre voluntad y en saladero cubierto.
- **Restricciones de uso del producto:** Preferiblemente no suministrar en zonas con suelos y forrajes con deficiencia de molibdeno y selenio.
- **Regiones:** Algunas zonas identificadas en Magdalena Medio de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y zonas específicas en Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Sucre y Tolima.

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASAL 8% CONTROL SELENIO Y MOLIBDENO	Cría	Vacas paridas	100 a 150
		Vacas horras vacías	100 a 150
		Vacas horras preñadas	80 a 100
		Novillas reemplazo	60 a 80
	Lechería	Vacas paridas	120 a 170
		Vacas horras vacías	120 a 170
		Vacas horras preñadas	80 a 120
		Novillas reemplazo	60 a 80
	Toros		150 a 250

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

> Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

> Presentaciones:

Saco de polipropileno laminado con liner de polietileno

GANASAL CRÍA

- Regiones:** Trópico medio y bajo de Antioquia, Boyacá, Caldas, Huila, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, Tolima, Cesar, Caribe Sur (Córdoba, Sucre), Caquetá, Guaviare, Magdalena, Meta, Vichada.

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASAL CRÍA	Cría	Vacas paridas	80 a 120
		Vacas horras vacías	80 a 120
		Vacas horras preñadas	60 a 80
		Novillas reemplazo	60 a 80
	Lechería	Vacas paridas	100 a 150
		Vacas horras vacías	100 a 150
		Vacas horras preñadas	80 a 120
		Novillas reemplazo	60 a 80
	Toros		150 a 250

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

> Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

> Presentaciones:

Saco de polipropileno laminado con liner de polietileno, en presentación de 40 kg y 50 kg.

GANASAL CRÍA ORIENTE ARAUCA / CASANARE

> Indicaciones de uso:

- Suministrar a las hembras bovinas en hatos de cría y lechería según los requerimientos para las diferentes etapas productivas y de peso vivo.
- Para óptimos resultados proporcione el producto con base en la oferta, la calidad nutricional del forraje y la época del año. El suministro debe ser preferiblemente diario o con frecuencia de máximo 2 días, a libre voluntad y en saladero cubierto protegido del sol y la lluvia.
- **Restricciones de uso del producto:** Preferiblemente no suministrar en zonas con suelos y forrajes con altos niveles de selenio.
- **Regiones:** Departamentos de Arauca y Casanare.

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASAL CRÍA ORIENTE ARAUCA / CASANARE	Cría	Vacas paridas	80 a 120
		Vacas horras vacías	80 a 120
		Vacas horras preñadas	60 a 80
		Novillas reemplazo	60 a 80
	Lechería	Vacas paridas	100 a 150
		Vacas horras vacías	100 a 150
		Vacas horras preñadas	80 a 120
		Novillas reemplazo	60 a 80
	Toros		150 a 250

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

> Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

> Presentaciones:

Saco de polipropileno laminado con liner de polietileno, en presentación de 40 kg.

GANASAL 7%

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASAL 7%	Cría	Vacas paridas	80 a 120
		Vacas horras vacías	80 a 120
		Vacas horras preñadas	60 a 80
		Novillas reemplazo	60 a 80
	Lechería	Vacas paridas	100 a 150
		Vacas horras vacías	100 a 150
		Vacas horras preñadas	80 a 120
		Novillas reemplazo	60 a 80
	Toros		150 a 250

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

> Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

> Presentaciones:

Saco de polipropileno laminado con liner de polietileno, en presentación de 40 kg y 50 kg.

GANASAL 7% CAQUETÁ

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASAL 7% CAQUETÁ	Cría	Vacas paridas	80 a 120
		Vacas horras vacías	80 a 120
		Vacas horras preñadas	60 a 80
		Novillas reemplazo	60 a 80
	Lechería	Vacas paridas	100 a 150
		Vacas horras vacías	100 a 150
		Vacas horras preñadas	80 a 120
		Novillas reemplazo	60 a 80
	Toros		150 a 250

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

> Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

> Presentaciones:

Saco de polipropileno laminado con liner de polietileno, en presentación de 50 kg.

GANAZUFRE CRÍA

- **Restricciones de uso del producto:** Preferiblemente no suministrar en zonas con suelos y forrajes con altos niveles de selenio.
- **Regiones:** Algunas zonas identificadas en el litoral norte que influyen los departamentos de Atlántico, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Guajira y Magdalena, y zonas específicas como: Cesar, Meta, Caquetá, Guaviare, Vichada y Sucre.

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANAZUFRE CRÍA	Cría	Vacas paridas	100 a 150
		Vacas horras vacías	100 a 150
		Vacas horras preñadas	80 a 100
		Novillas reemplazo	60 a 80
	Lechería	Vacas paridas	120 a 170
		Vacas horras vacías	120 a 170
		Vacas horras preñadas	80 a 120
		Novillas reemplazo	60 a 80
	Toros		150 a 250

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

> Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

> Presentaciones:

Saco de polipropileno laminado con liner de polietileno, en presentación de 40 kg y 50 kg.

GANASAL SABANA PRÓXIMAS

- **Restricciones de uso del producto:** Preferiblemente no suministrar en hatos ubicados en zonas con suelos y forrajes con altos niveles de selenio.
- **Regiones:** Trópico alto, medio y bajo de Antioquia, Boyacá, Cauca, Caldas, Cundinamarca, Huila, Nariño, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, Tolima, Valle del Cauca; Cesar, Magdalena, Meta, Vichada.

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASAL SABANA PRÓXIMAS	Cría	Vacas horras preñadas	100 a 120
		Novillas reemplazo	80 a 120
	Lechería	Vacas secas horras preñadas	120 a 150
		Novillas reemplazo	80 a 120

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

> Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

> Presentaciones:

Saco de polipropileno laminado con liner de polietileno, en presentación de 40 kg y 50 kg.

GANASTEN VET

- **Vacas lecheras de alta producción:** 10 gramos por cada litro de leche producida vaca/día, repartidos en dos suministros.
- Se sugiere continuar con la estrategia de suplementación mineral que se esté suministrando.

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASTEN VET	Cría	Donadoras 30 días previos a la aspiración	100 a 150
		Receptoras 30 días previos al protocolo	100 a 150
		Toros 60 días previos a la colecta	100 a 150
	Lechería	Vacas en fase de lactancia	10 g/LITRO

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

➤ Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

➤ Presentaciones:

Saco de polipropileno laminado con liner de polietileno, en presentación de 10 kg.

SUPER GANASAL 12%

- **Restricciones de uso del producto:** Preferiblemente no suministrar en zonas seleníferas y zonas salino-sódicas.
- **Regiones:** Trópico alto, medio y bajo de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, Tolima, Cesar, Caribe Sur (Córdoba, Sucre), Guaviare, Magdalena, Meta, Vichada.

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
SUPER GANASAL 12%	Lechería	Vacas en fase de lactancia	120 a 250

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

> Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

> Presentaciones:

Saco en polipropileno laminado con liner en polietileno, en presentación de 40 kg.

GANASAL 10%

- Para óptimos resultados proporcione el producto con base en la oferta, la calidad nutricional del forraje y la época del año. El suministro debe ser preferiblemente diario o con frecuencia de máximo 2 días, a libre voluntad y en saladero cubierto.
- **Restricciones de uso del producto:** Preferiblemente no suministrar en zonas seleníferas.
- **Regiones:** Trópico alto, medio y bajo de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, Tolima, Cesar, Caribe Sur (Córdoba, Sucre), Guaviare, Magdalena, Meta, Vichada.

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASAL 10%	Lechería	Vacas en fase de lactancia	120 a 250

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

> Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

> Presentaciones:

Saco en polipropileno laminado con liner en polietileno, en presentación de 10 kg, 40 kg y 50 kg.

GANASAL LECHE

- **Restricciones de uso del producto:** Preferiblemente no suministrar en zonas seleníferas y salino sódicas.
- **Regiones:** Trópico alto, medio y bajo de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, Tolima, Cesar, Caribe Sur (Córdoba, Sucre), Guaviare, Magdalena, Meta, Vichada.

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASAL LECHE	Lechería	Vacas en fase de lactancia	120 a 250

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

> Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

> Presentaciones:

Saco en polipropileno laminado con liner en polietileno, en presentación de 10 kg, 40 kg y 50 kg.

- No utilizar simultáneamente con concentrados cuyo contenido de proteína sea superior al 20%, sin una evaluación previa de la dieta.
- Garantizar disponibilidad permanente de agua limpia y forraje suficiente.
- Realizar una adaptación gradual al producto cuando los animales no estén acostumbrados al consumo de suplementos proteinados.

➤ **Regiones recomendadas:**

Formulada para sistemas de producción ubicados en zonas de trópico bajo, especialmente donde las vacas y búfalas en producción consumen forrajes tropicales de mediana o baja calidad nutricional. Puede utilizarse en diferentes regiones del país, siempre que las condiciones del sistema, la dieta base y los requerimientos de los animales sean compatibles con su formulación.

Regiones: Trópico bajo de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, Tolima, Cesar, Caribe Sur (Córdoba, Sucre), Guaviare, Magdalena, Meta, Vichada, Caquetá, Arauca y Casanare.

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASAL ENERGY LECHERÍA TROPICAL	Lechería tropical y/o lechería doble propósito	Vacas o búfalas en lactancia	150 a 200
	Lechería alta producción	Vacas de alta producción (> 30 Litros)	200 a 350

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

➤ **Conservación del producto:**

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

➤ **Presentaciones:**

Saco en polipropileno laminado con liner en polietileno, en presentación de 10 kg y 40 kg.

GANASAL CÁLCICA

> Indicaciones de uso:

- Suministrar a vacas paridas en hatos de lechería especializada, basándose en los requerimientos para los diferentes tercios de lactancia, nivel de producción y peso vivo.
- Para óptimos resultados proporcione el producto con base en la oferta, la calidad nutricional del forraje y la época del año. El suministro debe ser preferiblemente diario o con frecuencia de máximo 2 días, a libre voluntad y en saladero cubierto.
- **Restricciones de uso del producto:** Preferiblemente no suministrar en zonas seleníferas.
- **Regiones:** Trópico alto, medio y bajo de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, Tolima, Cesar, Caribe Sur (Córdoba, Sucre), Guaviare, Magdalena, Meta, Vichada.

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASAL CÁLCICA	Lechería	Vacas en fase de lactancia	120 a 250

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

> Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

> Presentaciones:

Saco en polipropileno laminado con liner en polietileno, en presentación de 40 kg y 50 kg.

GANASAL CÁLCICA PODAL

- **Restricciones de uso del producto:** Preferiblemente no suministrar en zonas seleníferas.
- **Regiones:** Trópico alto, medio y bajo de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, Tolima, Cesar, Caribe Sur (Córdoba, Sucre), Guaviare, Magdalena, Meta, Vichada.

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASAL CÁLCICA PODAL	Lechería	Vacas en fase de lactancia	120 a 250

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

➤ Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

➤ Presentaciones:

Saco en polipropileno laminado con liner en polietileno, en presentación de 40 kg.

GANASAL CÁLCICA ENERGY

- **Regiones:** Zonas de lechería especializada y doble propósito. Regiones con forrajes altos en fósforo como el Kikuyo o Rye Grass y deficiencias de microminerales (Cobre, Zinc, Selenio). Ideal en áreas donde la dieta esté apoyada con subproductos industriales o silo de maíz o avena. La relación calcio:fósforo debe ser de 2:1, factores como materias primas o manejos pueden alterarla, por lo cual la sal Ganasal Cálcica Energy puede ayudar a su balance.

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASAL CÁLCICA ENERGY	Lechería	Vacas en fase de lactancia	120 a 250

*Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

➤ Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

➤ Presentaciones:

Saco en polipropileno laminado con liner en polietileno, en presentación de 10 Kg y 40 kg.

GANACALCIO

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANACALCIO	Lechería	Vacas en fase de lactancia	100 a 200

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

➤ Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

➤ Presentaciones:

Saco en polipropileno laminado con liner en polietileno en presentación de 25 kg y tarro plástico paca 12 (T12 X 1) por 1 kg, y paca 16 (T4 X 4) por 4 kg.

GANASAL 6% PODAL

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASAL 6% PODAL	Cría	Novillas de levante	60 a 80
		Novillas reemplazo	80 a 100
	Lechería	Terneras de levante	40 a 60
		Novillas de levante	60 a 80
		Novillas reemplazo	80 a 100
	Levante / Ceba	Levante ♀ ♂	60 a 80
		Ceba ♀ ♂	80 a 100
	Toros		100 a 200

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

➤ Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

➤ Presentaciones:

Saco de polipropileno laminado con liner de polietileno, en presentación de 40 kg y 50 kg.

GANASAL 5%

- Restricciones de uso del producto:** No usar en hatos ganaderos ubicados en zonas de litoral, además de zonas específicas de Cesar y Cundinamarca.
- Regiones:** Trópico alto, medio y bajo de Antioquia, Boyacá, Cauca, Caldas, Cundinamarca, Huila, Nariño, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, Tolima, Valle del Cauca; Bolívar, Cesar, Magdalena, Meta, Vichada.

TABLA DE CONSUMO SUGERIDA			
PRODUCTO	ETAPA PRODUCTIVA	TIPO DE INVENTARIO	CONSUMO EN GRAMOS ANIMAL/DÍA
GANASAL 5%	Cría	Novillas de levante	60 a 80
		Novillas reemplazo	80 a 100
	Lechería	Terneras de levante	40 a 60
		Novillas de levante	60 a 80
		Novillas reemplazo	80 a 100
	Levante / Ceba	Levante ♀ ♂	60 a 80
		Ceba ♀ ♂	80 a 100
		Toros	100 a 200

*El consumo es variable y estará condicionado por el peso vivo de los animales, la oferta y calidad del forraje, época climática y frecuencia de suministro.

Le recomendamos tener una comunicación permanente con su aliado técnico GANASAL para ser un ganadero ganador de verdad.

➤ Conservación del producto:

Almacenar bajo techo, sobre estibas de madera o plástico, separado de las paredes, en un lugar con buena ventilación, apartado de productos agroquímicos y de animales que puedan contaminar el producto.

➤ Presentaciones:

Saco de polipropileno laminado con liner de polietileno, en presentación de 10 kg, 40 kg y 50 kg.

